

带状疱疹ワクチン比較表

	乾燥弱毒水痘ワクチン	シングリックス
ワクチン種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種方法	皮下注射・1回	筋肉注射 2回(2～6か月後)
対象年齢	50歳以上	50歳以上
発症予防効果	51.30%	50歳以上97.2% 70歳以上89.8%
带状疱疹 後痛抑制効果	66.50%	50歳以上100% 70歳以上85.5%
持続期間	5年程度	9年以上
副反応	軽度の接種部位の痛み、 腫れ、発赤 ※3～7日で消失	軽度の接種部位の痛み、 腫れ、発赤、倦怠感、頭痛 ※3～7日で消失
当院負担額（税込）	10,500円 (助成金対象 6,500円)	22,000円 (助成金対象 12,000円)
長所	☆1回で済む ☆費用が安い	☆予防効果が高い 妊婦や免疫が 低下している方も接種ができる ☆持続期間が長い
短所	☆妊婦や免疫力が低下してい る方は接種ができない ☆持続期間が短い	☆費用が高い ☆副反応が比較的強い (接種部位の痛み78%) ☆2回接種が必要

よくある質問

Q. 新型コロナワクチンとの摂取間隔は？

A. 2週間以上必要です

Q. 弱毒性水痘ワクチンを接種済みでも”シングリックス”は接種可能？

A. 接種できます

