

带状疱疹ワクチンの比較表

	乾燥弱毒水痘ワクチン	シングリックス
ワクチン種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種方法	皮下注射・1回	筋肉注射 2回(2～6か月の間)
対象年齢	50歳以上	18歳以上
発症予防効果	51.3%	50歳以上97.2% 70歳以上89.8%
带状疱疹後 神経痛抑制効果	66.5%	50歳以上100% 70歳以上85.5%
持続期間	5年程度	10年以上
副反応	軽度の接種部位の痛み、 腫れ、発赤 ※3～7日で消失	軽度の接種部位の痛み、腫 れ、 発赤、倦怠感、頭痛 ※3～7日で消失
費用(税込)	10,500円	22,000円
長所	☆1回で済む ☆費用が安い	☆予防効果が高い 妊婦や 免疫が低下している方も接 種ができる ☆持続期間が長い
短所	☆妊婦や免疫力が低下して いる方は接種ができない ☆持続期間が短い	☆費用が高い ☆副反応が比較的強い (接種部位の痛み78%) ☆2回接種が必要

よくある質問

Q.新型コロナワクチンとの接種間隔は

A.2週間以上必要です



Q.弱毒性水痘ワクチン接種済みでも”シングリックス”の接種は可能か

A.接種できます